2018년 12월 4일 화요일

하얗게 빛나는 치아…자신감 '쑥쑥'



〉 차이미백 〈



붉은 입술과 하얀 이를 뜻하는 단순호 치(丹脣皓齒)는 예로부터 미인의 기 본조건으로 꼽혔다. 하얀 피부, 하얀 치아, 하얀 손을 뜻하는 삼백미 (三白 美) 또한 미인의 3대 조건으로 꼽히면 서 하얗고 깨끗한 치아는 미에 있어 중 요한 요인이 되고 있다.


이처럼 아름다움을 추구하는 일반 인들의 욕구가 커지면서 병원을 찾는 사람도 늘고 있다. 치아미백 치료법에 대해 상무스타치과병원 김운규 대표 원장의 이야기를 들어보자.

치아 미백은 누렇게 변색 된 치아의 표면을 원래 치아 색상으로 회복시키 거나 더 하얗게 만들어주는 치료다. 칫솔질이나 스케일링으로 해결되지 않은 치아의 변색을 치아 성형처럼 치 아의 삭제나 손상 없이 미백제 성분의 약리 작용으로 원래의 색조로 회복시 켜준다. 변색 된 치아를 약제와 특수 광선을 이용해 하얗게 만드는 시술로 짧은 시간에 미백효과를 볼 수 있다.

◇변색 원인

치아의 표면은 법랑질(치아 표면) 과 이를 보호하는 상아질로 구성돼 있 다. 법랑질은 약간 반투명이면서 연한 노란 빛 또는 회색빛이 나는 흰색이며 상아질은 노란빛을 띤다. 나이를 먹으 면서 법랑질은 닳고 투명해지며 상아 질의 노란빛이 드러나게 된다.

치아변색은 크게 외적인 요인과 내 적인 요인 둘로 나뉜다. 먼저 외적인 요인은 치아 외상에 의해 검게 변색



김운규 상무스타치과병원 대표원장이 치아변색으로 내원한 환자에게 미백시술을 하고 있다.

치아변색 노화·치아착색 등 내·외적 요인 다양 스케일링 후 특수성분 미백제 치아 내부로 침투 시술 후 불소함유 치약・유색소 음식・흡연 삼가야

된 경우, 노화 , 치아착색, 치태가 침 착 등이다. 내적인 요인으로는 유전 적 또는 전신적 병력에 의한 경우, 치 아 형성기에 섭취한 약물로 외상에 의 한 치수 변화로 변색 된다.

▲전문가(병원치료)미백= 병원에 서 효과적이고 안정적인 미백제와 특 수레이져 광선 미백기를 이용해 시행 하는 방법이다. 미백기에서 방출하는 특수 광선의 열로 고농도 미백제의 반 응을 촉진, 치아 미백효과를 높이고 미백 기간을 단축할 수 있다는 장점이 있다. 시술법은 약제를 치아의 면에 도포해 메틸 힐라이트 광원을 이용, 치아의 색을 밝게 만드는 진료로 평균 2~3회 내원하면 된다.

▲자가 미백= 자가 미백은 치과 의 사의 지도하에 집에서 하는 미백법이 다. 전문가 미백에 비해 저농도의 미 백제를 사용하며, 개인 맞춤형 미백 틀(미백 트레이)에 미백제를 고르게 분포시켜 수면시간에 착용하는 치료 방법이다. 변색의 정도가 심한 경우 의료진 미백과 시행하면 높은 효과를 기대할 수 있다. 자신 치아에 맞는 틀 을 특수 제작해 집에서 4시간 2~4주간

미백제를 넣고 착용하는 방식이다. ▲실활치 미백= 치아가 원래의 활 력을 상실했다고 해서 실활치라고 부

른다. 주된 요인은 신경의 손상으로 변색이 생기게 된다. 한 개 또는 소수 의 치아만이 변색 된 경우 신경치료를 하고 치아 속에 미백제를 삽입해 경과 가 지남에 따라 치아의 색이 변하는 것 을 확인하며 기존의 치아의 색과 비슷 한 색을 나타낼 때까지 진행한다. 보 통 4주 정도의 기간을 두고 치료한다.

◇미백 시술법

사진 촬영을 거쳐 치아상태를 확인 한뒤 스케일링 먼저 진행 한다. 스케 일링은 치아 표면과 틈새에 끼어있는 치태, 치석 등 이물질을 깨끗이 청소 하고 부은 잇몸을 가라앉힌다. 이후 특수한 성분의 미백제를 치아 내부로 침투시켜 법랑질과 상아질에 침착된 착색물을 제거하는 것으로 치아를 손 상시키지 않고 안전하고 후유증이 없 다. 이어 치아 미백제를 치아에 도포 한 뒤 BLUE·GREEN·RED 3기 지 파장을 사용해 15분 간격으로 3회 시술하고 미백을 완료 후 치아상태 및 밝기와 색상을 확인한다.

치아의 표면인 법랑질은 유기물과

무기물, 수분으로 구성돼 있다. 이 사 이에는 비어있는 공간이 많은데 이 사 이로 색소가 침투해 변색 된다. 미백 제의 주성분인 과산화수소가 구강 내 에서 분해되면서 산소를 방출하게 되 는데 이 산소가 법량질과 상아질 내로 들어가서 착색된 물질을 표백하게 된

◇미백 후 관리

불소가 함유된 치약은 미백효과를 떨어뜨리고 미백제의 활성화를 악화 시킴으로 미백 후 8시간은 치약으로 양치질하지 않는 것이 좋다. 또 미백 후에는바로너무뜨겁거나차가운음 식을 먹으면 치아가 민감해 질 수 있 음으로 시술 후 2시간 동안은 음식물 섭취를 피해야 한다. 치아 미백을 한 후에는 최소 48시간 정도는 활성화된 성분이 치아에 남아있을 뿐만 아니라 색소성 물질에 쉽게 노출 될 수 있어 유색소 음식과 흡연은 가급적 피해야 한다. 또 미백 직후에는 치아 표면에 미백약품 찌꺼기가 남아 꺼끌꺼끌하 게 느껴지고 시린 현상이 나타날 수 있으나 1~3주 후면 증상이 완화된다. /정리=이나라 기자



도움말 김운규 대표원장 〈상무스타치과병원〉



청연한방병원은 최근 우즈베키스탄 타슈켄트의과대행 내에서한의진료협력센터 개소 /청연한방병원 제공 식을 가졌다.

청연한방병원 중앙아시아 진출 가시화

우즈베키스탄 한의진료협력센터 개소 현지 의과대학생 교육·무료 진료 상담

즈베키스탄 현지에 한의진료협력센터 차를 가하고 있다.

청연한방병원은 최근 우즈베키스탄 타슈켄트의과대학 내에 한의진료협력 센터 개소식을 갖고 본격적인 업무에 돌입했다.

리에브 바호디르 카라모노비치 보건부 제1차관, 베김쿠로브 우조크보이 쇼임 쿠로비치 교육부 차관, 라지즈 노디로 비치 투이쳬프 타슈켄트의과대학 총장 등이 참석했다. 우리나라에서는 박종 하 보건복지부 한의약산업과장, 염용

청연한방병원(병원장 김지용)이 우 권 한국보건산업진흥원 기획이사, 박 종승 청연국제진료센터 센터장, 신애 를 운영하는 등 중앙아시아 진출에 박 숙우즈베키스탄 한의진료협력센터 센 터장이 참석했다.

이번 한의진료협력센터는 한국보건 산업진흥원이 '2018 우즈베키스탄 지 역 내 한의진료센터 구축 및 운영사업' 의 일환으로 추진했으며 청연한방병원 개소식에는 우즈베키스탄의 유수파 은 지난 9월 수탁운영기관으로 선정돼 운영을 맡게 됐다.

청연한방병원은 우즈베키스탄 한의 진료협력센터에서 현지 의과대학생 대 상 한의약 교육, 무료 진료 상담, 한의 약 진출 정보 수집을 할 계획이다.

/이나라 기자



화순전남대병원 소아암 환경보건센터는 최근 소아암 치료 관계자들을 대상으로 환경 유해인자 관련 심포지엄을 개최했다. /화순전남대병원 제공

소아암-환경유해인자 관련성 논의

화순전남대병원, 소아암 환경보건센터 심포지엄

화순전남대학교병원(원장 정신)은 최근소아암과 환경 유해인자와의 관련 성을 연구하는 심포지엄을 열었다.

원내 소아암 환경보건센터(센터장 국훈)가 환경부 후원으로 진행된 이번 행사에는 환경성 질환 전문가와 소아암 치료 관계자들이 참석, 심도있는 논의 를 펼쳤다.

참석자들은 얼룩물고기(zebrafish)를 이용한 환경독성물질인 다이옥신 의 독성을 줄일 수 있는 물질 개발과 화

학사고 이후 건강영향평가에 대해 살펴 봤다. 생약성분 의약품 복용에 따른 중 금속 중독의 위험성, 소아 영상검사에 서 방사선의 영향 등에 대한 강의도 이 어졌다.

국훈 센터장은 "환경 독성물질에 대 한 위험성과 그 예방정책 방향을 점검 해보고, 소아암과 환경 유해인자와의 관련성에 대한 여러 전문가들의 경험을 공유했다. 유익한 공동연구를 지속적 으로 진행해나가겠다"고 밝혔다.

